

® BARCLAY PROPYZ

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

ERBICIDA SELETTIVO per il diserbo di lattughe e insalate e della colza invernale

Meccanismo d'azione HRAC: K1

BARCLAY PROPYZ - Registrazione del Ministero della Salute n. 16106 del 24/07/2015

COMPOSIZIONE

PROPYZAMIDE pura g. 34,3% (=400 g/L)

Coformulanti q.b. a g. 100

BARCLAY CHEMICALS (R&D) Ltd.

Damastown Way

Damastown Industrial Park

Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Tel. 00 353 1 8112900

Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited 2016

Contenuto: 1 - 5 L Partita n.

Stabilimenti di produzione:

BARCLAY CHEMICALS MANUFACTURING Ltd.

Damastown Way, Damastown Industrial Park,

Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Phyteurop S.A.

ZA Europe Champagne, rue Pierre My,

49 260 Montreuil Bellay (Francia)

Safapac Limited

4 Stapledon Road, Orton Southgate, PE2 6TB (Regno Unito)

Distribuito da: DIACHEM SpA

Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG) Tel. 0363 355611

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 Sospettato di provocare il cancro. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di miscelazione / carico del prodotto e durante la sua applicazione usare tuta completa da lavoro e guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.



ATTENZIONE

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

BARCLAY PROPYZ è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. L'applicazione deve essere fatta impiegando 200-1000 litri di acqua per ha. BARCLAY PROPYZ è indicato nel diserbo selettivo delle lattughe e simili e della colza.

Per l'applicazione su colza invernale impiegare 200-400 litri di acqua per ha. Per l'applicazione su lattughe e simili impiegare 400-1000 litri di acqua per ha.

ATTIVITÀ ERBICIDE NEI CONFRONTI DELL PIÙ COMUNI INFESTANTI

1. Infestanti sensibili: *Alopecurus* spp.(coda di volpe), *Digitaria sanguinalis* (*Sanguinella comune*), *Lolium* spp.(Loglio Italo), *Avena fatua* (in pre-emergenza), ed in genere tutte le graminacee annuali nonchè, nel periodo invernale alcune graminacee poliennali, *Chenopodium album* (*Farinello comune*), *Stellaria media* (*Centocchio*), *Tribulus terrestris* (*Tribolo comune*), *Trifolium pratense* (*Trifoglio*).

2. Infestanti mediamente sensibili: *Amaranthus* spp. (*Amaranto comune*)

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO:

Lattughe e insalate (lattughe, scarola/indivia, cicorie/radicchi): alla dose di 1.75-3.75 l/ha distribuiti con 400-1000 litri d'acqua per ettaro in:

- pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interrimento; in post-semina va effettuata nei 15 giorni successivi.

- post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido-

Colza: alla dose di 1.75 l/ha distribuiti con 200-400 litri di acqua per ettaro, su colture in atto in autunno-inverno; non trattare fino a che le piante meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 3 foglie vere.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si usa da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU LATTUGHE E SIMILI E 150 GIORNI SU COLZA INVERNALE

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del BARCLAY PROPYZ e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture mediamente tolleranti (mais, fragola, sorgo, batata, crucifere): 2 mesi.

b) Colture mediamente sensibili (melanzane, lino, aglio, menta, cipolla, peperone, patata, spinacio, barbabietola da zucchero, pomodoro): 4 mesi.

c) Colture molto sensibili (cereali da granella in genere (orzo, avena, frumento, segale) e graminacee foraggere): 6 mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

®Barclay Propyz sono marchi registrati di Barclay Chemicals (R&D) Ltd