



UPL Italia srl  
Via Terni 275  
47522 Cesena (FC)  
0547 661523  
upl-ltd.com/it  
info@uplitalia.com

**Cesena, 24.02.2025**

**Oggetto: Adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di Captano, di titolarità ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. e distribuiti da UPL ITALIA srl**

*Gentile cliente,*

la presente per comunicarLe che nel rispetto delle nuove disposizioni specifiche previste dal Reg. UE 2024/2186 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva captano e, viste le disposizioni del Comunicato del Ministero della Salute datato 29 ottobre 2024 con oggetto "Proroga del periodo di validità delle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Captan ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2186 della Commissione che ne rinnova l'approvazione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 della Commissione", sono state adeguate, con entrata in vigore dal 1 febbraio 2025, le etichette dei seguenti prodotti fitosanitari a base di captano:

- Captan Arvesta 80 WG (Reg. N° 13716)
- Malvin 80 WG (Reg. N° 9809)

**Per maggiori dettagli relativamente alle nuove disposizioni, si prega di far riferimento alle etichette allegate alla presente comunicazione.**

I lotti dei suddetti prodotti fitosanitari fabbricati fino al 31 gennaio 2025 con vecchia etichetta potranno essere commercializzati fino al 30 aprile 2025 ed impiegati da parte degli utilizzatori fino al 31 ottobre 2025.

A disposizione per qualsiasi chiarimento,

Cordiali saluti

UPL Italia srl

# CAPTAN ARVESTA 80 WG

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola

Granuli idrodispersibili

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M 4

## CAPTAN ARVESTA 80 WG

### Composizione

100 grammi di prodotto contengono

Captano puro g 80

Coformulanti q.b. a g 100

### Indicazioni di pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

### Consigli di Prudenza

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

### PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione Ministero della Salute n. 13716 del 22.03.2007

**TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:** ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères, Francia – Tel. 0033.5.59609292

**Officine di produzione:** ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia); KWIZDA AGRO GmbH – Loebendorf (Austria); Arysta Lifescience Ougrée Production sprl – Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio); Arysta LifeScience India Limited (EOU-Unit-II) – Survey No. 229 & 230, Kalol Notified Area, Kalol (Panchmahal), Gujarat (India); Arysta LifeScience India Limited - 50 A, G.I.D.C., Kalol Survey No. 317-318, Kankarna Muvada, Derol Dist., Panchmahal-389320, Gujarat, India


**Officina di confezionamento:** STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

**Stabilimento di rietichettatura:** ARCO Logistica S.r.l. – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara

**Distribuito da:** UPL Italia Srl – Via Terni 275, S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523

Contenuto netto: Kg. 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-2,5-5-10-15

Partita n. ....



### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 10 m per: melo, pero, cotogne, nashi, pesche, nettarine, susine e ciliegie; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m in combinazione con una fascia vegetativa di 20 m per: albicocche; per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali per: pomodoro. – **Attenzione:** durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quando si manipola il prodotto concentrato respiratore a visiera del tipo EN146 o THP2 o equivalente con cappuccio e mantellina), indumenti protettivi, guanti adatti e occhiali protettivi – In caso di applicazioni su mele o altri fruttiferi posizionati in alto utilizzare solo irroratori montati su trattori con cabina chiusa o auto-assistiti. Deve inoltre essere usato, ove percorribile, un controllo automatico dell'esposizione dell'operatore in aggiunta ai suddetti dispositivi di protezione individuale. Comunque il controllo meccanico può sostituire l'equipaggiamento di protezione personale se una valutazione del COSHH dimostri che questi forniscono un uguale o maggiore standard di protezione - Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore - Per lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.

**Avvertenza:** Consultare un centro antiveleni.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

È essenziale garantire una buona copertura. Applicare su fruttiferi un volume minimo di 500 litri d'acqua per ettaro. Assicurarsi che l'attrezzatura sia correttamente calibrata prima dell'uso. Non lasciare la soluzione di prodotto nell'irroratore per lunghi periodi. (ad es. durante i pasti o la notte). CAPTAN ARVESTA 80 WG è un fungicida ad azione preventiva, quindi la prima applicazione deve essere fatta subito prima che compaia la malattia, con applicazioni ripetute agli intervalli raccomandati per garantire l'opportuna protezione.

#### Preparazione della miscela

Agitare accuratamente prima e durante l'applicazione. Aggiungere la quantità raccomandata di CAPTAN ARVESTA 80 WG nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà. Usare solo acqua pulita.

Per irroratore idraulico: riempire a metà il serbatoio spray con acqua pulita e mantenerlo in agitazione. Aggiungere la quantità richiesta di CAPTAN ARVESTA 80 WG quindi portare a volume, mantenendo il serbatoio in agitazione fino a quando la miscela è completa.

Per pompe a spalla: mescolare con cura ed usare immediatamente.

**Non trattare nella fase di fioritura della coltura e prima del trattamento sfalcare le piante infestanti in fiore presenti nei filari delle colture.**

COLTURE	Epoca di applicazione	Dose d'impiego di prodotto per ettolitro d'acqua se non diversamente specificato	Dose massima di prodotto per ettaro	Numero massimo di trattamenti	Note	Indicazioni	Malattie controllate	Intervallo pre-raccolta (giorni)
Mele, Pere, Cotogne, Nashi	Dalla fine della fioritura	0.15-0.18 kg	2 kg (pari a 1600 g di captano)	10	La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare il limite di 15.1 kg per ettaro	L'uso su fruttiferi è consentito solo mediante attrezzature che garantiscano un incremento della precisione e dell'accuratezza dell'applicazione e la minima dispersione al di fuori della vegetazione fogliare bersaglio e attraverso tecniche e modalità di trattamento a più basso impatto ambientale rispetto a quelle convenzionali (ad esempio riduzione dei volumi di irrorazione in funzione della parete o del volume da trattare, ecc.) affinché, pur mantenendo il tasso di applicazione sulle superfici bersaglio, venga garantita la dose efficace sulla superficie o volume fogliare e si riduca di almeno il 61% la quantità di prodotto distribuita al di fuori della stessa vegetazione del prodotto fitosanitario (quindi applicata per ettaro). Inoltre dette attrezzature e tecniche di applicazione dovranno assicurare una riduzione di almeno il 20 % della perdita di prodotto fitosanitario al suolo rispetto alle attrezzature e tecniche di applicazione convenzionali.	Ticchiolatura ( <i>Venturia spp.</i> ), Monilia ( <i>Monilia sp.</i> ), Maculatura bruna del pero ( <i>Stemphylium vesicarium</i> )	21
Pesche, Nettarine	da caduta foglie a prime foglie distese	0.3 kg	3,75 kg (pari a 3000 g di captano)	1-2	La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare il limite di 10.8 kg per ettaro		Bolla ( <i>Taphrina deformans</i> ), Monilia ( <i>Monilia sp.</i> ), Corineo ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> )	21
	da inizio invaiatura a frutto maturo per la raccolta	0.15 kg	2,25 kg (pari a 1800 g di captano)	3				
Albicocche, Susine	da caduta foglie a prime foglie distese	0.3 kg	3,75 kg (pari a 3000 g di captano)	1-2	La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare il limite di 10.8 kg per ettaro		Monilia ( <i>Monilia sp.</i> ), Corineo ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> ).	21
	da inizio invaiatura a frutto maturo per la raccolta	0.15 kg	2,25 kg (pari a 1800 g di captano)	3				
Ciliegie	da caduta foglie a prime foglie distese	0.3 kg	3,75 kg (pari a 3000 g di captano)	1-2	La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare il limite di 10.8 kg per ettaro	Monilia ( <i>Monilia sp.</i> ), Corineo ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> )	21	
	da inizio invaiatura a frutto maturo per la raccolta	0.15 kg	2,25 kg (pari a 1800 g di captano)	3				
Pomodori	Alla comparsa dei primi sintomi	0.15-0.19 kg	2,25 kg (pari a 1800 g di captano)	4	-	-	Alternaria ( <i>Alternaria sp.</i> ), Muffa grigia ( <i>Botrytis cinerea</i> ), Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	21
Fragole in serra	Alla comparsa dei primi sintomi	1.5 kg p.f./ha	1,5 kg (pari a 1200 g di captano)	2	-	-	Muffa grigia ( <i>Botrytis cinerea</i> )	14

**COMPATIBILITÀ:** non impiegare CAPTAN ARVESTA 80 WG in miscela estemporanea con prodotti alcalini, oli e a base di zolfo. Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare CAPTAN ARVESTA 80 WG.

**FITOTOSSICITÀ:** Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Delicious, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna), sulle quali se ne sconsiglia l'impiego. Per ulteriore sicurezza e/o in caso di varietà di più recente introduzione si consiglia di effettuare un saggio preliminare su di una porzione limitata di vegetazione.

#### ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato


# Etichetta in formato ridotto per le taglie da 50 e 100 grammi

## CAPTAN ARVESTA 80 WG

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, pomodoro e fragola

Granuli idrodispersibili

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M 4

<p><b>CAPTAN ARVESTA 80 WG</b></p> <p><b>Composizione</b> 100 grammi di prodotto contengono Captano puro g 80 Coformulanti q.b. a g 100</p> <p><b>Indicazioni di pericolo (H)</b> H318 Provoca gravi lesioni oculari. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.</p> <p><b>Consigli di Prudenza (P)</b> P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.</p> <p>PRODOTTO FITOSANITARIO Registrazione Ministero della Salute n. 13716 del 22.03.2007</p> <p><b>TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE</b> <b>ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.</b> – BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères, Francia – Tel. 0033.5.59609292</p> <p><b>Distribuito da:</b> UPL Italia Srl – Via Terni 275, S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523 Contenuto netto: Kg. 0,05-0,1</p>	<p><b>PERICOLO</b></p>  <p>Partita n. ....</p>
<p><b>PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO – IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE</b></p>	