

# CONSPICUO®

Fungicida in Granuli Idrodispersibili (WG)  
Codici FRAC: 7 (Boscalid), 11 (Piraclostrobin)

## CONSPICUO®

Autorizzazione del Ministero della salute N. 18560 del 05.12.2024

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Boscalid puro	g	26,7
Piraclostrobin puro	g	6,7
Coformulanti q. b. a	g	100

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H361d Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.,**  
30<sup>th</sup> floor, Hanyu Financial Centre, Building A5-5,  
No. 7000 East Jingshi Road, Jinan, 250101 Cina

Rappresentata in Italia da:  
**Rainbow Agrosiences Co., Ltd.,**  
Inniscarra, Main Street, Rathcoole, Co. Dublino, Irlanda  
Tel. +34 973737377

### Stabilimenti di produzione:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd., Shandong, Cina  
Qingdao Rainbow Chemical Co., Ltd., Qingdao, Shandong, Cina  
Ningxia Rainbow Chemical Co., Ltd., Ningxia, Cina  
RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U., Lleida, Spagna

### Distribuito da

Corteva Agriscience Italia s.r.l – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona Tel. +39 0372709900

Contenuto: 0,5-1-2,5-5 Kg



**ATTENZIONE**

Partita n. vedi timbro

® Marchio registrato del gruppo RAINBOW

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Nel caso in cui sia necessario rientrare dopo un breve periodo dall'applicazione, indossare indumenti protettivi e guanti.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Per lavorazioni in serra e in ambienti ad essa assimilabili utilizzare guanti, tuta e maschera filtrante tipo FFP2

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica e di supporto.

Consultare un Centro Antiveneni

### CARATTERISTICHE

CONSPICUO® è un fungicida indicato per la lotta contro: le moniliosi di pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio; la cladosporiosi (nerume) del susino; la cladosporiosi del pomodoro; l'oidio di pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carota, colture ornamentali e floreali; la botrite di bietole da foglia e da costa, fragola, broccoli, pomodoro, melanzana, peperone, lattughe e insalate, scarola, spinacio, piccoli frutti (piante arbustive e a bacche), colture ornamentali e floreali ed erbe aromatiche; la sclerotinia di lattughe e insalate, scarola, erbe aromatiche; l'antracnosi di fragola; l'alternariosi di broccoli, cavolfiore, carota; la stemfiliosi dell'asparago; la ruggine di asparago, cipolla, aglio, scalogno; il marciume bianco di cipolla, aglio e scalogno.

### MODO D'AZIONE

Boscalid e piraclostrobin appartengono a due gruppi chimici distinti, le carbossianilidi e le strobilurine rispettivamente, e posseggono un diverso meccanismo d'azione.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è applicabile solo in pieno campo su pesco, susino, nettarina, ciliegio, albicocco, carota, piccoli frutti, broccoli, cavolfiore, aglio, cipolla, scalogno, asparago, scarola; sia in pieno campo sia in serra su fragola, pomodoro, peperone, melanzana, erbe aromatiche e lattughe e insalate (eccetto scarola), spinacio e bietola da foglia e da costa, colture ornamentali e floreali.

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro, indicate in tabella; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro. CONSPICUO® deve essere applicato preventivamente nei periodi a rischio per le malattie delle colture autorizzate. Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi. Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare CONSPICUO® o altri prodotti contenenti boscalid o piraclostrobin (o altri fungicidi appartenenti alla famiglia chimica delle carbossianilidi o delle strobilurine) per più di 3 volte nell'arco dell'anno su drupacee (pesco, nettarina, albicocco, susino e ciliegio), pomodoro, peperone, melanzana asparago, cavolfiore e broccoli e colture ornamentali e floreali (in serra); non più di 2 volte nell'arco dell'anno su fragola, lattughe e insalate (eccetto scarola), carota, cipolla, aglio, scalogno, spinacio, bietole da costa e da foglia, erbe aromatiche e piccoli frutti e colture ornamentali e floreali (in pieno campo); non più di 1 volta nell'arco dell'anno su scarola. È consigliabile alternare CONSPICUO® con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Coltura	Malattia	Dose g/hl	Dose Kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° max. trattamenti all'anno
Pesco, nettarina, albicocco e ciliegio	Moniliosi e oidio	60-75	0,60-0,75	7-14	3

Susino	Moniliosi, oidio e cladosporiosi	60-75	0,60-0,75	7-14	3
Nocciolo	Necrosi grigia	100	1	10-15	2
Fragola (in campo e serra)	Botrite, oidio ed antracnosi	150-180	1,5-1,8	7-10	2
Frutti di piante arbustive	Botrite	150	1,5	7-10	2
Altra piccola frutta a bacche	Botrite	150	1,5	7-10	2
Pomodoro (in campo e serra)	Botrite, oidio e cladosporiosi	100 - 150	1-1,5	7-10	3
Melanzana (in campo e serra)	Botrite ed oidio	150	1,5	7-10	3
Peperone (in campo e serra)	Botrite ed oidio	100 - 150	1-1,5	7-10	3
Scarola (in pieno campo)	Botrite e sclerotinia	150	1,5	-	1
Lattughe e insalate (in campo e serra)	Botrite e sclerotinia	150	1,5	7-10	2
Valerianella in campo e serra (raccolta dopo lo stadio fenologico di 8° foglia)	Botrite e sclerotinia	150	1,5	7-10	2
Spinacio (in campo e serra)	Muffa grigia	150	1,5	7-10	2
Bietole da foglia e da costa (in campo e serra)	Muffa grigia	150	1,5	7-10	2
Erbe aromatiche (in campo e serra)	Botrite, sclerotinia	150	1,5	7-10	2
Broccoli	Alternariosi e muffa grigia	100	1	7-10	3
Cavolfiore	Alternariosi	100	1	7-10	3
Asparago	Stemfiliosi e ruggine	100 - 150	1-1,5	10-15	3
Carota	Alternariosi ed oidio	100	1	7	2
Cipolla, aglio, scalogno (foglie)	Botrite, ruggine, marciumi bianco e verde	150	1,5	7	2
Colture ornamentali e floreali (in serra)	Botrite e oidio	100 -150	1-1,5	7-10	3
Colture ornamentali e floreali (in pieno campo)	Botrite e oidio	100 -150	1-1,5	10	2

**ATTENZIONE:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO  
NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**FITOTOSSICITÀ:** CONSPICUO®<sup>®</sup>, impiegato da solo, non ha mai causato sintomi di fitotossicità sulle diverse varietà delle colture sopra elencate. Dato il gran numero di specie e varietà e le differenti condizioni ambientali, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

**COMPATIBILITÀ:** CONSPICUO®<sup>®</sup> è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

#### **PREPARAZIONE DELLA MISCELA**

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare; riempire il serbatoio con acqua fino a metà; mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose necessaria; continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione; dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un detergente idoneo.

**Sospendere i trattamenti: 120 giorni prima della raccolta per asparago; 28 giorni prima della raccolta su nocciolo; 21 giorni prima della raccolta su scarola, 14 giorni prima della raccolta su lattughe e insalate (eccetto scarola), spinaci, bietole da foglia e da costa, broccoli, cavolfiore, carota, cipolla, aglio, scalogno, ed erbe aromatiche; 3 giorni prima della raccolta su pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, pomodoro, melanzana, peperone, frutti di piante arbustive ed altra piccola frutta a bacche.**