

DALLAS K

Fungicida in granuli idrodispersibili

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

- Captano puro: g 80
- Coformulanti: q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica della pelle (H317). Provoca gravi lesioni oculari (H318). Nocivo se inalato (H332). Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici (H400). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto (P101). Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Procurarsi le istruzioni prima dell'uso (P201). Non respirare la polvere/la nebbia/i vapori/gli aerosol (P260). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). In caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico (P308+P313). Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico (P310). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente (P501).

PERICOLO



Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.,
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor 30006 Murcia, Spagna - Tel. +39 02 3604 2884

Registrazione Ministero della Salute n. 12233 del 21.07.2004

Stabilimenti di produzione e confezionamento: Solfotecnica Italiana S.p.A. 48010 Cotignola (Ra).

Stabilimenti di confezionamento: LUQSA S.A. Afores s/n, CP: 25173, Sudanel, (Lleida), Spagna / Chemia S.p.a. Via Statale n.327- 44047 Dosso di S. Agostino (Ferrara) / FARMA-CHEM S.A. SINDOS 570 22 P.O. BOX – 1026 THESSALONIKI, Grecia / AGROPAK Spółka Jawna Brzeziński i wspólnicy 43-603 Jaworzno Darwina Id, Polonia / SCAM Spa Strada Bellaria 164, Modena / AGROTOTAL Produtos Agroquimicos, S.A. R. Dos Navegantes, No. 48 - R/C Esq. 1200 - 732 Lisboa, Portogallo / MORAAGRO Kft. 3937 Komlóská, Rákóczi út 121, Ungheria / Pakon Sp.z o.o. ul.Zakładowa 7 62-510 Konin, Polonia

Distribuito da: Ascenza Italia S.r.l., Via Varese 25/G - 21047 Saronno (VA) - Tel. 02-84944669

Taglie: g 500 - kg 1-5-10-20-25-200

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire l'attrezzatura di distribuzione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nei campi trattati prima che lo spray depositato sulla superficie delle foglie non sia completamente asciugato. In caso le colture da trattare si trovino nei pressi di zone residenziali, rispettare una distanza di 10 m da esse e utilizzare ugelli che riducano la deriva del 50%. Per proteggere gli organismi acquatici:

- Non usare su terreni sabbiosi.
- Mele e pere: rispettare una fascia non trattata di 15 m dai corpi idrici superficiali o rispettare una fascia non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali con utilizzo di tecniche che riducano la deriva del 50%.
- Pesche, nettarine e albicocche (applicazioni tardive): rispettare una fascia vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali con utilizzo di tecniche che riducano la deriva del 75%. **Attenzione:** durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione, usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Per lavorazioni agricole indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Per gli usi in serra: ventilare a fondo la serra fino all'essiccazione dello spray prima di accedervi nuovamente.

Non trattare nella fase di fioritura della coltura e prima del trattamento sfalciare le piante infestanti in fiore presenti nei filari delle colture.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinfaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

DALLAS K è un fungicida preventivo che agisce per contatto, da impiegarsi su mele e pere

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni di impiego	note	N. max trattamenti / anno
Mele e pere	Ticchiolatura, (<i>Venturia inaequalis</i>) <i>Gloeosporium</i> spp. <i>Monilia</i> spp.	1880 g/ha (riferiti a 1000-1500 lt acqua/ha)	Impiegare il prodotto a partire dalla fine della fioritura. Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere minimo 10 giorni.	L'uso su fruttiferi è consentito solo mediante attrezzature che garantiscano un incremento della precisione e dell'accuratezza dell'applicazione e la minima	7

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni di impiego	note	N. max trattamenti / anno
Pesche e Nettarine (applicazioni tardive, "al verde")	Bolla del pesco (<i>Taphrina deformans</i>)	1800 g/ha (riferiti a 600-1000 lt acqua/ha)	Impiegare il prodotto a partire dalla fine della fioritura. Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere 14 giorni.	dispersione al di fuori della vegetazione fogliare bersaglio e attraverso tecniche e modalità di trattamento a più basso impatto ambientale rispetto a quelle convenzionali (ad esempio riduzione dei volumi di irrorazione in funzione della parete o del volume da trattare, schermature per le emissioni, irroratrici schermate, irroratrici con campane di protezione, irroratrici a tunnel, irroratrici controllate da sensori, ecc.) affinché, pur mantenendo il tasso di applicazione sulle superfici bersaglio, venga garantita la dose efficace sulla superficie o volume fogliare e si riduca di almeno il 61% la quantità di prodotto distribuita al di fuori della stessa vegetazione del prodotto fitosanitario (quindi applicata per ettaro). Inoltre, dette attrezzature e tecniche di applicazione dovranno assicurare una riduzione di almeno il 20% della perdita di prodotto fitosanitario al suolo rispetto alle attrezzature e tecniche di applicazione convenzionali	2
Pesche, Nettarine e albicocche (applicazioni tardive, "al verde")	Marciume bruno (<i>Monilia spp.</i>)	1800 g/ha (riferiti a 1200 lt acqua/ha)	Impiegare il prodotto a partire dalla fine della fioritura. Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere 14 giorni.		2
Ornamentali in serra	Maculatura fogliare	0,1-0,4% (riferito a 200-400 lt acqua/ha) equivalente a 0,4-0,8 kg prodotto/ha	Impiegare il prodotto a partire dallo sviluppo delle foglie fino ad inizio fioritura (esclusa). Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere minimo 10 giorni.		3
Vivai di piante ornamentali e di colture arboree in serra	Maculatura fogliare	0,1-0,4% (riferito a 200-400 lt acqua/ha) equivalente a 0,4-0,8 kg prodotto/ha	Impiegare il prodotto a partire dallo sviluppo delle foglie fino ad inizio fioritura (esclusa). Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere minimo 10 giorni.		3

La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare il limite di:

- 9,9 kg per ettaro per Mele e Pere;
- 2,7 kg per ettaro per Pesche, Nettarine e Albicocche

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di Melo (Stark, Delicious, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di Pero (Butirra 'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna).

GESTIONE DELLE RESISTENZE: Per ridurre l'insorgere di fenomeni di resistenza, si consiglia l'impiego di fungicidi con diverso meccanismo di azione.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA (POMACEE e DRUPACEE)

ATTENZIONE:

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 Kg deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.