

FORCE® ULTRA

Insetticida del terreno in formulazione microgranulare per la protezione di mais e barbabietola da zucchero

Tefluthrin – Codice IRAC 3

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

teflutrin puro g 1,5
coformulanti q. b. a g 100
Contiene: tefluthrin



INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se inalato.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non disperdere nell'ambiente.

In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Raccogliere il materiale fuoriuscito

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 13809 del 11 maggio 2016

Stabilimenti di produzione:

SYNGENTA España, S.A. – Porrino (Spagna)

EXWOLD Technology Ltd, Hartlepool (Inghilterra)

ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)

Stabilimento di confezionamento:

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (RA)

Stabilimenti di rietchettatura:

ARCO Logistica S.r.l. – via Monari 5, Ferrara (FE)

ARCO Logistica S.r.l.- via Battistella 22, Ferrara (FE)

Partita n.

Contenuto netto: 500 g, kg 1, 5, 10, 20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Si consiglia di utilizzare i guanti durante le fasi di miscelazione e applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Consultare un Centro Antiveleini.

CARATTERISTICHE

FORCE ULTRA è un insetticida piretroide particolarmente attivo nei confronti di coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi che trascorrono parte del loro ciclo di vita nel terreno. Il prodotto agisce per contatto e, nella fase di vapore, possiede una forte attività repellente che aumenta l'efficacia protettiva.

FORCE ULTRA è attivo a basse dosi e grazie al suo meccanismo d'azione, diverso rispetto ai prodotti organofosforici e carbammati, può anche risultare idoneo per le raccomandazioni tecniche che prevedono la rotazione nell'impiego dei geodisinfestanti.

MODALITA' D'IMPIEGO

Normalmente FORCE ULTRA si distribuisce lungo la fila al momento della semina con microgranulatori adeguatamente tarati; tuttavia, in mancanza di tali attrezzature, il prodotto può essere distribuito con altri mezzi adeguati in superficie e successivamente incorporato a 3-5 cm di profondità nel terreno con una leggera erpicatura.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Le dosi qui riportate si riferiscono a trattamenti da effettuarsi con i microgranulatori e lungo la fila della coltura. Per eventuali interventi a pieno campo le dosi vanno aumentate proporzionalmente in relazione alla maggior superficie da proteggere. Impiegare le dosi maggiori nelle aree ove sulle precedenti coltivazioni si sono già verificate significative infestazioni oppure in previsione di attacchi che si protraggono nel tempo.

| Coltura | Parassiti | Dose | |
|--------------------------|--|----------|---|
| | | kg/ha | g/100 m lineari |
| Mais | <i>Diabrotica</i> spp. | 12,2 | 91,5 (distanza interfila 75 cm) |
| | <i>Agriotes</i> spp | 7 – 12,2 | 52,5 – 91,5 (distanza interfila 75 cm) |
| Barbabietola da zucchero | <i>Agriotes</i> spp. <i>Atomaria linearis</i> <i>Chaetocnema tibialis</i> <i>Scutigera</i> spp. <i>Tipula</i> spp. | 4 - 5 | 18,0 – 22,5 (distanza interfila 45 cm) |

AVVERTENZA

Divieto di impiego in serra.

Come di norma, prima delle usuali pratiche di manutenzione, pulire l'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

COMPATIBILITA'

Per l'uso raccomandato non è necessaria la miscela con altri prodotti fitosanitari.

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Operare in assenza di vento

Da non vendersi sfuso

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato