

GOLTIX
DISERBANTE SELETTIVO PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA DA FOGLIA E DA COSTA, BIETOLA ROSSA

TIPO DI FORMULAZIONE: MICROGRANULARE IDRODISPERDIBILE

Meccanismo d'azione: gruppo 5 WSSA (C1 HRAC)

GOLTIX

Registrazione Ministero della Salute n. 2732 del 16.01.1978

COMPOSIZIONE

g 100 di GOLTIX contengono:
 METAMILTRON puro g 70
 coformulanti q. b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 - Nocivo se ingerito. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 - Contiene (Disodum maleate). Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 - Non mangiare né bere né fumare durante l'uso. P391 - Raccogliere la fuoriuscita. P401 - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 - 24050 Grassano (BG) - Tel. 035328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA AGAN Ltd P.O.B: 262, Ashdod - Israele
 SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano Sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI)
Stabilimenti di ri-etichettatura:
 Arco Logistica Srl - via Monari 5 Ferrara
 Arco Logistica Srl - via Battistella 22 Ferrara

Contenuto: 1-5 kg

Partita n.:

Bietola rossa

Epoca di applicazione	n° applicazioni per anno	Dosi/ha per applicazione
Pre-emergenza	1	2 - 5 kg/ha
Pre-emergenza +	1 +	2 - 3 kg/ha +
Post-emergenza	1 - 3	0,62 - 2 kg/ha
Post-emergenza	1 - 3	0,1 - 1,5 kg/ha

Non superare la dose massima di 5 kg/ha di prodotto per anno. Tale dose è ridotta a 4,5 kg/ha per programmi in sola post-emergenza.

Nei programmi in cui l'applicazione in pre-emergenza è seguita da una o più applicazioni in post-emergenza, non superare il quantitativo totale di 2 kg/ha di prodotto distribuito in post-emergenza per anno.

Il dosaggio è in funzione della natura del terreno, dell'infestazione e della strategia di intervento prevista. Si consiglia di utilizzare il dosaggio più basso in miscela con altre sostanze attive per completare lo spettro d'azione.

Si consiglia di utilizzare volumi d'acqua compresi tra 200 e 500 l/ha.

Per interventi frazionati in post-emergenza applicazione in miscela con prodotti ad azione foliare, intervenendo con barbabietole a 2 foglie vere e ripetendo il trattamento dopo 5-10 giorni prevedendo 2-3 trattamenti.

Bietola da foglia e da costa

Epoca di applicazione	n° applicazioni per anno	Dosi/ha per applicazione
Pre-emergenza	1	1 - 1.5 kg/ha

Non superare la dose massima di 1,5 kg/ha di prodotto per anno.

Il dosaggio è in funzione della natura del terreno, dell'infestazione e della strategia di intervento prevista. Si consiglia di utilizzare il dosaggio più basso in miscela con altre sostanze attive per completare lo spettro d'azione.

Si consiglia di utilizzare volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha.

SPETTRO D'AZIONE
ERBE INFESTANTI SENSIBILI:

Amaranto (*Amaranthus spp.*), Borsapastore comune (*Capsella bursapastoris*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Centocchio (*Stellaria media*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Farinello (*Chenopodium album*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Poligono

Barbabietola da zucchero a semina fine inverno - inizio primavera

Epoca di applicazione	n° applicazioni per anno	Dosi/ha per applicazione
Pre-emergenza	1	2 - 5 kg/ha
Pre-emergenza +	1 +	2 - 3 kg/ha +
Post-emergenza	1 - 3	0,6 - 2 kg/ha
Post-emergenza	1 - 3	0,5 - 1 kg/ha

Non superare la dose massima di 5 kg/ha di prodotto per anno. Tale dose è ridotta a 3 kg/ha per programmi in sola post-emergenza.

Il dosaggio per applicazioni in pre-emergenza è in funzione della natura del terreno, dell'infestazione e della strategia di intervento prevista e dell'impiego del prodotto da solo o in miscela con altre sostanze attive.

Per interventi frazionati in post-emergenza applicazione in miscela con prodotti ad azione foliare, intervenendo con barbabietole a 2 foglie vere e ripetendo il trattamento dopo 5-10 giorni prevedendo 2-3 trattamenti

Si consiglia di utilizzare volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha.

persicaria (*Persicaria maculosa*), Veronica comune (*Veronica persica*), Viola dei campi (*Viola arvensis*).

Avvertenza: in post-emergenza non trattare barbabietole in stress vegetativo determinato da cause ambientali o parassitarie.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Dato l'elevato numero di varietà, si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole superfici prima di passare a trattare superfici più ampie.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

In caso di fallimento della coltura: barbabietola da zucchero, barbabietole da foraggio, bietole da orto possono essere seminate senza alcun periodo di attesa; patate e mais possono essere seminate in seguito ad aratura profonda. I cereali autunno-vernini possono essere seminati nella stessa stagione in seguito ad aratura profonda lasciando trascorrere tre mesi dall'ultima applicazione. Le colture primaverili possono essere seminate nella stagione successiva senza adottare alcun accorgimento.

GESTIONE DELLA RESISTENZA:

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo di azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione culturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti con il prodotto ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio Fitosanitario Regionale di competenza) in caso di sospetta resistenza.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI BIETOLA DA FOGLIA E DA COSTA

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO