

**Prima parte**  
**Etichetta per utilizzatori professionali**

**Seconda parte**  
**Etichetta per utilizzatori non professionali**

# MOMENTUM

**Fungicida sistemico per la difesa di agrumi, vite e pero  
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)**

## MOMENTUM

Registrazione del Ministero della Salute n. 15235 del 12.09.2014

### Composizione

100 g di prodotto contengono:  
Fosetil Alluminio puro 80 g  
Coformulanti q.b. a 100 g



**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H319-Provoca grave irritazione oculare.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi / il viso; P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.; P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

### ADAMA Makhteshim Ltd.

Northern Industrial Zone Hebron Road  
P.O. Box 60 Beer-Sheva 84100, Israel  
Rappresentata in Italia da:

### ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica 19, 24050 Grassobbio (BG) -Tel 035 328811

### Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - Beer-Sheva (Israele)  
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)  
Kollant S.r.l. – Maniago (PN)

Distributore: KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)

**Contenuto netto:** 500 g; 1-5-10 kg **Partita n.** vedi timbro

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

**INFORMAZIONI MEDICHE:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

### CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico attivo nei confronti dei ficomiceti ed in particolare contro ficomiceti della famiglia delle peronosporacee. Il suo principio attivo è caratterizzato da una notevole mobilità con

sistemicità sia ascendente che discendente. L'attività del formulato è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in attiva crescita, permettendo, grazie alla sua sistemicità, di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente al trattamento.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO):** contro Gommosi parassitaria (*Phytophthora* spp.), effettuare fino a 3 applicazioni fogliari per stagione, alla dose massima di **4,5 kg/ha** per applicazione (300 g/hl, con volume d'acqua consigliato di 1500 litri).

Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire efficientemente il prodotto, è possibile eseguire applicazioni con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche.

**VITE:** contro Peronospora (*Plasmopora viticola*) in trattamenti preventivi alla dose di **250 g/hl (2,5 kg/ha)**. Non utilizzare volumi di acqua superiori a 1000 l/ha. Effettuare fino ad un massimo di 4 trattamenti per stagione.

Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno. È opportuno utilizzare MOMENTUM in miscela con fungicidi di contatto (es. Folpet) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia.

**PERO:** contro gemme nere (*Pseudomonas syringae*), **200-250 g/hl** in 3 trattamenti nel periodo aprile-giugno.

Non superare la dose massima di **4,5 kg/ha** per singola applicazione.

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico ed ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i suddetti formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### SOSPENDERE I TRATTAMENTI

15 giorni prima della raccolta su agrumi

15 giorni prima della raccolta su pero

28 giorni prima della raccolta su vite

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

### NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12.09.2014 e modificata ai sensi dell'Art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 24.07.2019"

# MOMENTUM PFnPE

Fungicida sistemico per la difesa di agrumi, vite e pero  
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

## MOMENTUM

Registrazione del Ministero della Salute n. 15235 del 12.09.2014

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 30/04/2019, nel caso di proroghe della scadenza del prodotto la suddetta validità non potrà comunque superare il 2 maggio 2020"

### Composizione

100 g di prodotto contengono:  
Fosetil Alluminio puro 80 g  
Coformulanti q.b. a 100 g



**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H319-Provoca grave irritazione oculare.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi / il viso; P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.; P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

### ADAMA Makhteshim Ltd.

Northern Industrial Zone Hebron Road  
P.O. Box 60 Beer-Sheva 84100, Israel  
Rappresentata in Italia da:

### ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica 19, 24050 Grassobbio (BG) -Tel 035 328811

### Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - Beer-Sheva (Israele)  
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)  
Kollant S.r.l. – Maniago (PN)

Distributore: KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)

**Contenuto netto:** 500 g      **Partita n.** vedi timbro

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.  
Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

**INFORMAZIONI MEDICHE:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

## CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico attivo nei confronti dei fomiciceti ed in particolare contro fomiciceti della famiglia delle peronosporacee. Il suo principio attivo è caratterizzato da una notevole mobilità con sistemicità sia ascendente che discendente. L'attività del formulato è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in attiva crescita, permettendo, grazie alla sua sistemicità, di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente al trattamento.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO):** contro Gommosi parassitaria (*Phytophthora* spp.), effettuare fino a 3 applicazioni fogliari per stagione, alla dose massima di **4,5 kg/ha** per applicazione (300 g/hl, con volume d'acqua consigliato di 1500 litri).

Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire efficientemente il prodotto, è possibile eseguire applicazioni con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche.

**VITE:** contro Peronospora (*Plasmopora viticola*) in trattamenti preventivi alla dose di **250 g/hl (2,5 kg/ha)**. Non utilizzare volumi di acqua superiori a 1000 l/ha. Effettuare fino ad un massimo di 4 trattamenti per stagione.

Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno. È opportuno utilizzare MOMENTUM in miscela con fungicidi di contatto (es. Folpet) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia.

**PERO:** contro gemme nere (*Pseudomonas syringae*), **200-250 g/hl** in 3 trattamenti nel periodo aprile-giugno.

Non superare la dose massima di **4,5 kg/ha** per singola applicazione.

## COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame, di dicofol e con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico ed ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i suddetti formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

## SOSPENDERE I TRATTAMENTI

15 giorni prima della raccolta su agrumi

15 giorni prima della raccolta su pero

28 giorni prima della raccolta su vite

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

## NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12.09.2014 e modificata ai sensi dell'Art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 24.07.2019"

**DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**