

NOIDIO GOLD 10 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro l'Oidio del pesco, della vite, del tabacco, e di alcune colture ortive ed ornamentali.

NOIDIO GOLD 10 EC

Composizione

-Penconazolo puro g. 10,20 (100 g/l)

-coformulanti q.b. a g 100

Contiene cicloesanone

INDICAZIONI DI PERICOLO

Liquido e vapori infiammabili. Sospettato di nuocere al feto. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

AGRIMIX s.r.l. - Via Campobello, 1 - 00071 Pomezia (RM) - tel. +39 06 5296221

Registrazione n°11926 del 4/02/2004 del Ministero della Salute

Stabilimenti di Produzione e confezionamento:

ALTHALLER ITALIA s.r.l. -S. Colombano al Lambro (MI)

KWIZDA AGRO GmbH , Leobendorf, Austria

SCAM S.p.A., S. Maria di Mugnano (Modena)

SAPEC AGRO S.A., Zona Industrial da Mitrena - Herdade das Praias, Setubal - Portogallo

CHEMIA S.P.A. - Via Statale, 327 44047 Dosso - Terre del Reno (Ferrara)

Contenuto netto: Litri 0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5-1-5-10-20

Partita n°



ATTENZIONE

evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

Il NOIDIO GOLD 10EC è un fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE: contro Oidio (Uncinula necator)

- Trattamenti preventivi: 25-30 ml/hl in pre e post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni; 15-20 ml/hl in pre e post-fioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni. Con attacchi di Oidio in atto (primi sintomi), effettuare 2 trattamenti ad intervallo di 5-7 giorni con Noidio Gold 10 EC alla dose di 50 ml/hl, quindi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un'attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopeziza spp.

PESCO: contro Oidio

-Trattamenti preventivi: In zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili, effettuare i trattamenti alla dose di 40-50 ml/hl dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi, utilizzare il dosaggio più elevato. Contro Monilia, Bolla, trattamenti invernali e Corineo, il Noidio Gold 10 EC esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti.

Contro malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)

- Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in preraccolta alla dose di 50 ml/hl.

TABACCO: contro Oidio: 35-50 ml/hl effettuando 2-4 trattamenti preventivi a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

COLTURE ORTICOLE (MELONE, ZUCCHINO, ZUCCA, CETRIOLO, CARCIOFO, PEPERONE IN PIENO CAMPO, POMODORO IN PIENO CAMPO, PISELLO)

Contro Oidio: In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, effettuare 2 (Zucchini e Cetriolo) - 4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: contro Oidio e Ruggini:

Utilizzare 25-50 ml/hl ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

N.B. Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Il prodotto va diluito in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Etichetta / Foglio illustrativo

COMPATIBILITA': Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizionale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

NOIDIO Gold 10 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro l'Oidio del pesco, della vite, del tabacco, e di alcune colture ortive ed ornamentali.

NOIDIO GOLD 10 EC

Composizione

-Penconazolo puro g. 10,20 (100 g/l)
-coformulanti q.b. a g 100
Contiene cicloesanone

INDICAZIONI DI PERICOLO

Liquido e vapori infiammabili. Sospettato di nuocere al feto. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

AGRIMIX s.r.l. - Via Campobello, 1 - 00071 Pomezia (RM) – tel. +39 06 5296221

Registrazione n°11926 del 4/02/2004 del Ministero della Salute

Stabilimenti di Produzione e confezionamento:

ALTHALLER ITALIA s.r.l. –S. Colombano al Lambro (MI)

KWIZDA AGRO GmbH , Leobendorf, Austria

SCAM S.p.A., S. Maria di Mugnano (Modena)

SAPEC AGRO S.A., Zona Industrial da Mitrena – Herdade das Praias, Setubal – Portogallo

CHEMIA S.P.A. - Via Statale, 327 44047 Dosso - Terre del Reno (Ferrara)

Contenuto netto: Litri 0,1

Partita n°



ATTENZIONE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE