

OBERON®

Insetticida/acaricida in sospensione concentrata per il controllo di acari e aleurodidi sulle seguenti colture orticole in serra: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchini, melone, cocomero, zucca, fagiolino, fragola

Composizione

100 g di Oberon® contengono:
22,9 g di Spiromesifen puro (240 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 208 Contiene Spiromesifen. Può provocare una reazione allergica.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la regolamentazione nazionale.



Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano.
Tel. 02.3972.1

ATTENZIONE

Registrazione Ministero della Salute n. 14136 del 24/02/2012

Officine di produzione e confezionamento: Bayer AG Dormagen (Germania); Bayer AG - Industriepark Höchst -Francoforte (Germania); Bayer SAS Villefranche (Francia); Bayer SAS - Marle-sur-Serre (Francia); Bayer CropScience LP – Kansas City (USA); Schirm GMBH - Lubeck (Germania); Schirm GMBH - Schonebeck (Germania); SBM Formulation – Bezier (Francia); Phyteurop S.A. – Montreuil- Bellay (Francia); Arysta LifeScience – Nogueres (Francia); Cheminova Deutschland GMBH – Stade (Germania); Isagro S.p.A.- Aprilia (Latina)

Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet – Valencia (Spagna)

Contenuto netto: ml 5-10-20-50-100-200-250-500; l 1-3-5-10-20

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante l'applicazione del prodotto indossare guanti e tuta protettiva.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveneni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per esclusivo impiego in serra.

Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchini: contro acari tetranichidi (*Tetranychus urticae*) utilizzare 45-60 ml/hl di prodotto (0,45-0,9 l/ha di prodotto in 1000-1500 l/ha di acqua in relazione allo sviluppo vegetativo della coltura); contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), eriofide rugginoso del pomodoro (*Aculops lycopersici*), acaro giallo del peperone (*Polyphagotarsonemus latus*) utilizzare 60 ml/hl di prodotto (0,6-0,9 l/ha di prodotto in 1000-1500 l/ha di acqua in relazione allo sviluppo vegetativo della coltura).

Melone, cocomero, zucca, fragola, fagiolino: contro acari tetranichidi (*Tetranychus urticae*) utilizzare 45-60 ml/hl di prodotto (0,45-0,6 l/ha di prodotto in 1000 l/ha di acqua); contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) utilizzare 60 ml/hl di prodotto (0,6 l/ha di prodotto in 1000 l/ha di acqua).

Intervenire alla comparsa degli stadi giovanili degli artropodi nocivi, ripetendo l'applicazione dopo almeno 10 giorni, se necessario. Effettuare al massimo 4 applicazioni per anno.

AVVERTENZE: il prodotto si impiega da solo. Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture orticole, si consiglia di effettuare saggi preliminari di selettività su alcune piante prima di trattare tutta la coltura.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per tutte le colture.

Attenzione. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.



® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it

16.10.2020_55_rettificata