

A TUTTI I CLIENTI

Cremona, 19 Giugno 2023

OGGETTO: p.f. STARANE GOLD (reg. 11341) volantinaggio etichetta per errore di stampa

Spett.le Cliente,


con la presente si comunica che il prodotto fitosanitario **STARANE GOLD (reg. 11341)** a base delle ss.aa. FLORASULAM puro g. 0,1 (=1 g/l) e FLUROXIPIR METIL puro g. 14,57 (=144,1 g/l, pari a 100 g/l di fluroxipir acido) a causa di un errore di stampa in etichetta richiede un'azione di volantinaggio per i seguenti lotti:

N° LOTTO
F006M49004
F006M49004
F006M24004
F006LBU001
F006LBU001
23E244I11
23E244I11
22K2444121

Pertanto si allega alla presente l'etichetta autorizzata corretta che vi invitiamo a consegnare all'atto della vendita a tutti i nostri clienti.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti



Dott.ssa Margherita Bradascio
Country Regulatory Leader
Corteva Agriscience Italia s.r.l.

STARANE™ GOLD

Erbicida selettivo per frumento, orzo e mais, efficace
contro infestanti dicotiledoni

SUSPO-EMULSIONE

Meccanismo d'azione: Gruppo B, Gruppo O (HRAC)

Composizione di STARANE GOLD

FLORASULAM puro g. 0,1 (=1 g/l)

FLUROXIPYR METIL puro g. 14,57 (=144,1 g/l, pari a 100 g/l di fluroxipyr acido)

Coformulanti q.b. a g. 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare indumenti protettivi/Proteggere gli occhi e il viso. P302+352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 non provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Corteva Agriscienze Italia s.r.l. - Via dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona
Tel. +39 0372 709900

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Corteva Agriscienze France S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)

Van Diest Supply Company - IA - U.S.A.

SINTECO LOGISTICS S.p.A. - San Giuliano Milanese (MI)-Italia (solo rietichettatura)

Taglie autorizzate: 1 - 3 - 5 - 10 litri

Registrazione n. 11341 del 22/05/2002 del Ministero della Salute
Partita n.: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Il preparato può diventare infiammabile durante l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: florasulam 1 g/l e fluroxipyr 100 g/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi: **Florasulam**: in caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Fluroxipyr**: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene. Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, orzo e mais, efficace contro infestanti dicotiledoni.

CAMPI D'IMPIEGO

FRUMENTO E ORZO: Pianta infestanti sensibili: Attaccamano (*Galium aparine*), Centocchio (*Stellaria media*), Poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Senape (*Sinapis arvensis*), Ravanella selvatica (*Raphanus raphanistrum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*). **Pianta infestanti mediamente sensibili:** Ruchetta violacea (*Diplotaxis erucoides*), Borsapastore (*Capsella bursa-pastoris*), Miagro peloso (*Rapistrum rugosum*), Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*).

Dosi d'impiego: 1,5-1,8 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo. Impiegare le dosi più elevate in presenza di grave infestazione di *Galium aparine*.

Epoca e modalità di applicazione: Trattare quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e fine levata. Effettuare un solo trattamento per ciclo colturale.

Avvertenza: Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare frumento e orzo, avena, segale e mais senza attendere nessun intervallo.

MAIS: Infestanti sensibili: Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Forbicina (*Bidens tripartita*). STARANE GOLD è attivo anche contro infestanti perennanti quali: Vilucchio (*Convolvulus arvensis*), Vilucchione (*Calystegia sepium*), Romice (*Rumex* spp.).

Dosi d'impiego: 1-1,2 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.

Epoca e modalità di applicazione: applicare STARANE GOLD dall'emergenza sino allo stadio di 6 foglie vere della coltura. Effettuare un solo trattamento per ciclo colturale.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- 1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
- 2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
- 3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.

Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

COMPATIBILITÀ: STARANE GOLD è miscibile con i principali prodotti autorizzati per la protezione delle colture indicate in questa etichetta.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. Pertanto è consigliabile evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Intervallo di sicurezza: non necessario

GESTIONE DELLE RESISTENZE: per evitare l'insorgere di infestanti resistenti attenersi alle indicazioni riportate in etichetta impiegando il prodotto in strategie di diserbo che includano prodotti a differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici, meccanici e fisici.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI

NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)

Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-333-2107947 (24H)

Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare: 0039-0372-709900 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 8 ottobre 2021