

A TUTTI I CLIENTI

Cremona, 23 Gennaio 2025

OGGETTO: p.f STARANE GOLD: decreto di ri-registrazione

Spett.le Cliente,

con la presente si comunica che con il Decreto Dirigenziale del **30/12/2024** è stato ri-registrato il prodotto fitosanitario **STARANE GOLD (reg n. 11341)** a base delle ss.aa **florasulam e fluroxypyr**.

Di seguito elencate in viola le modifiche rispetto alla etichetta precedentemente autorizzata:

VECCHIA ETICHETTA	NUOVA ETICHETTA
<p>Meccanismo d'azione: Gruppo B, Gruppo O (HRAC)</p>	<p>Meccanismo d'azione: Gruppi HRAC/WSSA 2 (già HRAC B) e 4 (già HRAC O)</p>
<p>INDICAZIONI DI PERICOLO H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p>	<p>INDICAZIONI DI PERICOLO H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H335: Può irritare le vie respiratorie. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. EU401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso</p>
<p>CONSIGLI DI PRUDENZA P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare indumenti protettivi/Proteggere gli occhi e il viso. P302+352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 non provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.</p>	<p>CONSIGLI DI PRUDENZA P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331: Non provocare il vomito. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.</p>

<p>PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI</p> <p>Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il preparato può diventare infiammabile durante l'uso.</p>	<p>PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI</p> <p>L'operatore deve indossare indumenti da lavoro e guanti durante le attività di miscelazione/caricamento e applicazione. L'utilizzo di protezioni per gli occhi e per la bocca è altamente consigliato durante le attività di miscelazione e carico. Non rientrare in campo prima che i depositi di spray sulle superfici fogliari si siano completamente asciugati. Se il lavoratore rientra in campo, gli indumenti da lavoro devono essere indossati. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare il prodotto a una temperatura inferiore ai 40 °C.</p>
<p>FRUMENTO E ORZO:</p> <p>Piante infestanti sensibili: Attaccamano (<i>Galium aparine</i>), Centocchio (<i>Stellaria media</i>), Poligono convolvolo (<i>Fallopia convolvulus</i>), Vilucchio comune (<i>Convolvulus arvensis</i>), Senape (<i>Sinapis arvensis</i>), Ravanello selvatico (<i>Raphanus raphanistrum</i>), Papavero (<i>Papaver rhoeas</i>), Camomilla comune (<i>Matricaria chamomilla</i>).</p> <p>Piante infestanti mediamente sensibili: Ruchetta violacea (<i>Diploaxis erucoides</i>), Borsapastore (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), Miagro peloso (<i>Rapistrum rugosum</i>), Miagro liscio (<i>Myagrum perfoliatum</i>).</p> <p>Dosi d'impiego: 1,5-1,8 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo. Impiegare le dosi più elevate in presenza di grave infestazione di <i>Galium aparine</i>.</p> <p>Epoca e modalità di applicazione: Trattare quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e fine levata. Effettuare un solo trattamento per ciclo culturale.</p>	<p>FRUMENTO E ORZO</p> <p>Piante infestanti sensibili: Galium aparine (Attaccamano), Stellaria media (Centocchio), Convolvulus arvensis (Vilucchio comune).</p> <p>Piante infestanti mediamente sensibili: <i>Papaver rhoeas</i> (Papavero), <i>Sinapis arvensis</i> (Senape), <i>Diploaxis erucoides</i> (Ruchetta violacea), <i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsapastore), <i>Matricaria chamomilla</i> (Camomilla comune), <i>Raphanus raphanistrum</i> (Ravanello selvatico), <i>Fallopia convolvulus</i> (Poligono convolvolo), <i>Rapistrum rugosum</i> (Miagro peloso), <i>Myagrum perfoliatum</i> (Miagro liscio).</p> <p>Dosi d'impiego: 1,5 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.</p> <p>Epoca e modalità di applicazione: Trattare quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e fine levata.</p>
<p>MAIS</p> <p>Dosi d'impiego: 1- 1,2 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.</p> <p>Epoca e modalità di applicazione: applicare STARANE GOLD dall'emergenza sino allo stadio di 6 foglie vere della coltura. Effettuare un solo trattamento per ciclo culturale</p>	<p>MAIS</p> <p>Dosi d'impiego: 1,2 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.</p> <p>Epoca e modalità di applicazione: applicare STARANE GOLD sino allo stadio di 6-7 foglie vere della coltura.</p>
<p>LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE</p> <p>Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura. 2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura. 	<p>LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE</p> <p>Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione.</p> <p>A questo scopo si raccomanda l'impiego di un detergente specifico per il lavaggio di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta di tale prodotto.</p>


<p>3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura. Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.</p>	
<p>GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l'insorgere di infestanti resistenti attenersi alle indicazioni riportate in etichetta impiegando il prodotto in strategie di diserbo che includano prodotti a differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici, meccanici e fisici.</p>	<p>GESTIONE DELLA RESISTENZA L'uso ripetuto di prodotti con il medesimo meccanismo d'azione può determinare la selezione di infestanti resistenti. Per prevenire o ritardare tale selezione è raccomandabile miscelare o alternare il prodotto con erbicidi a diverso meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti con STARANE GOLD ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio fitosanitario regionale di riferimento), in caso di sospetta resistenza.</p>

Per quanto riguarda la modalità di smaltimento delle scorte del p.f. con la vecchia etichetta, presente nei depositi di distributori/rivenditori, il prodotto potrà essere venduto al consumatore accompagnato dalla nuova etichetta in formato volantino, fino ad esaurimento scorte.

In allegato potete trovare l'etichetta attualmente autorizzata, che vi invitiamo a consegnare a tutti i clienti, affinché possano impiegare il prodotto secondo le corrette modalità agronomiche.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti



Dott.ssa Margherita Bradascio
Country Regulatory Leader
Corteva Agriscience Italia s.r.l.