

# STARANE™ GOLD

**Erbicida selettivo per frumento, orzo e mais, efficace contro infestanti dicotiledoni**

**SUSPO-EMULSIONABILE**

**Meccanismo d'azione: Gruppi HRAC/WSSA 2 (già HRAC B) e 4 (già HRAC O)**

## Composizione di STARANE GOLD

FLORASULAM puro g 0,1 (=1 g/l)  
FLUROXYPPYR METIL puro g. 14,57 (=144,1 g/l, pari a 100 g/l di fluroxipir acido)  
Coformulanti q b. a g 100  
Contiene: Hydrocarbons, C9, aromatics



## ATTENZIONE

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H335: Può irritare le vie respiratorie. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. EU401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331: Non provocare il vomito. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

**Corteva Agriscienze Italia s.r.l. – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona**  
Tel. +39 0372 709900

**Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:**

Corteva Agriscienze France S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)  
Van Diest Supply Company – IA – U.S.A.  
Chemark Zrt. Berhida (Hungary)  
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)  
HELENA INDUSTRIES – DES MOINES (USA)  
SINTECO LOGISTICS SPA – San Giuliano Milanese (MI) - Italia (solo rietchettatura)  
ARCO LOGISTICA S.R.L - Ferrara (FE) – Italia (solo ri-etchettatura)

**Taglie autorizzate: 1 - 3 - 5 - 10 litri**

Registrazione n. 11341 del 22/05/2002 del Ministero della Salute  
Partita n.: Vedere sulla confezione

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

L'operatore deve indossare abiti da lavoro e guanti durante le attività di miscelazione/caricamento e applicazione. L'utilizzo di protezioni per gli occhi e per la bocca è altamente consigliato durante le attività di miscelazione e carico. Non rientrare in campo prima che i depositi di spray sulle superfici fogliari si siano completamente asciugati. Se il lavoratore rientra in campo, gli indumenti da lavoro devono essere indossati.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare il prodotto a una temperatura inferiore ai 40 °C.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: florasulam 1 g/l e fluroxipyr 100 g/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi: **Florasulam:** in caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Fluroxipyr:** negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene. Terapia: sintomatica **Consultare un Centro Antiveneni.**

## USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbicida selettivo per frumento, orzo e mais, efficace contro infestanti dicotiledoni

## CAMPI D'IMPIEGO

### FRUMENTO E ORZO

**Piante infestanti sensibili:** Galium aparine (Attaccamano), Stellaria media (Centocchio), Convolvulus arvensis (Vilucchio comune).

**Piante infestanti mediamente sensibili:** *Papaver rhoeas* (Papavero), *Sinapis arvensis* (Senape), *Diploaxis erucoides* (Ruchetta violacea), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio).

**Dosi d'impiego:** 1,5 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo

**Epoca e modalità di applicazione:** Trattare quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e fine levata.

**Avvertenza:** Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare Frumento ed Orzo, Avena, Segale e Mais senza attendere nessun intervallo.

### MAIS

**Infestanti sensibili:** *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Bidens tripartita* (Forbicina). **STARANE GOLD** è attivo anche contro infestanti perennanti quali: *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchione), *Rumex* spp (Romice).

**Dosi d'impiego:** 1,2 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.

**Epoca e modalità di applicazione:** applicare STARANE GOLD sino allo stadio di 6-7 foglie vere della coltura.

### LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. A questo scopo si raccomanda l'impiego di un detergente specifico per il lavaggio di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta di tale prodotto.

### COMPATIBILITÀ

**STARANE GOLD** è miscibile con i principali prodotti autorizzati per la protezione delle colture indicate in questa etichetta.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### GESTIONE DELLA RESISTENZA

L'uso ripetuto di prodotti con il medesimo meccanismo d'azione può determinare la selezione di infestanti resistenti. Per prevenire o ritardare tale selezione è raccomandabile miscelare o alternare il prodotto con erbicidi a diverso meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti con **STARANE GOLD** ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio fitosanitario regionale di riferimento), in caso di sospetta resistenza.

### FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. Pertanto è consigliabile evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

**Intervallo di sicurezza:** non necessario

**ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

**Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare: 0039 0372 709900 /709999 (O.U.)**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30/12/2024