

# SULTAN

Diserbante selettivo per colza, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia e aglio  
SOSPENSIONE CONCENTRATA

## SULTAN

Registrazione del Ministero della Salute n. 11526 del 06.12.2002

Composizione

Metazachlor puro 44,3 g (=500 g/l)  
coformulanti q.b. a 100 g

### INDICAZIONI DI PERICOLO:

H302 - Nocivo se ingerito. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini; P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso; P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

**ADAMA AGAN Ltd.**

P.O.B. 262 - 77102 Ashdod - ISRAELE

**Rappresentata in Italia da:**

**ADAMA Italia S.r.l.**

Via Zanica 19, 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811

### Stabilimento di produzione:

ADAMA AGAN Ltd. - Ashdod 77100 - Israele

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano Sul Lambro (LO)

ADAMA Agricolture España SA 8970 - Humanes Madrid (Spagna)

### Stabilimento di confezionamento:

CHEMARK Zrt. - 8182 Peremarton - Ungheria

ADAMA Manufacturing Poland S.A. - Brzeg Dolny (Polonia)



**ATTENZIONE**

Contenuto: 1-5-10 l

Partita n.....

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. L'applicazione è limitata a una dose complessiva di non più di 1 kg/ha di sostanza attiva metazachlor in un periodo di 3 anni sullo stesso campo.

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**AVVERTENZA: consultare un centro antiveneni.**

### CARATTERISTICHE

Il SULTAN è un diserbante selettivo per **colza, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia e aglio**. Inibisce la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizza, subito dopo l'emergenza, le plantule delle malerbe. Il SULTAN viene assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie.

I migliori risultati erbicidi si conseguono al verificarsi di precipitazioni piovose dopo l'intervento diserbante.

Per una buona riuscita del trattamento erbicida si consiglia di preparare un letto di semina ben affinato e livellato e di deporre il seme ad una profondità costante.

Il prodotto controlla le seguenti infestanti:

- monocotiledoni annuali: Capellini dei campi (*Apera spica-venti*), Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Fienarola (*Poa* spp.), Giavone (*Echinochloa* spp.), Loglio (*Lolium* spp.), Pabbio (*Setaria* spp.), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*);

- dicotiledoni annuali: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria* spp.), Camomilla inodore (*Anthemis* spp.), Centocchio (*Stellaria* spp.), Falsa ortica (*Lamium* spp.), Farinello (*Chenopodium* spp.), Grespino (*Sonchus* spp.), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Morella (*Solanum* spp.), Nontiscordardime (*Myosotis* spp.), Ortica minore (*Urtica urens*), Papavero (*Papaver* spp.), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), *Veronica* spp.

### DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

**Colza: 2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.

Il trattamento si effettua preferibilmente in pre-emergenza, cioè subito dopo la semina ed al più tardi entro 3 giorni. Il trattamento può effettuarsi anche in post-emergenza precoce, quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula.

**Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia: 1,5 - 2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.

"Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 29.02.2016 e modificata ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 55/212 valida dal 03.11.2019"

Il trattamento si effettua subito dopo la messa a dimora della coltura e prima della crisi di trapianto. Qualora si effettuino dopo il trapianto abbondanti e frequenti irrigazioni, si consiglia l'impiego di un dosaggio più basso.

**Aglio: 1,5 - 2 litri** in 400-500 litri di acqua per ettaro.

Trattare preferibilmente subito dopo la messa a dimora dei bulbilli oppure in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2 - 4 foglie e con infestanti allo stadio di plantula.

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con altri erbicidi ad azione complementare e previsti per il diserbo delle stesse colture.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**Avvertenza:** Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**