

# TEMPORIS STAR

## INSETTICIDA

Emulsione olio / acqua

Meccanismo d'azione: IRAC A

### Composizione

Deltametrina pura 1,5% (=15 g/L)

Coformulanti q.b. a 100 g

**INDICAZIONE DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell'ambiente**

**REAZIONE: P391 Raccogliere la fuoriuscita.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**



**ATTENZIONE**

### Titolare della registrazione:

ALBAUGH TKI d.o.o.

Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

Tel.: +386 2 60 90 211 — www.albaugh.eu

Informazioni Tecniche: 800 986 776

Informazioni di emergenza CARECHEM (24h):

+44 (0) 1235 239 670 (chiamate gestite in lingua italiana)

### Officina di produzione:

Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd. No. 88 Rotam Rd., ETDZ, Kunshan, 215301 Jiangsu Province, Cina

Lanlix Cropscience Ltd., No.79. Hsiang Yang Rd., Chang Chih Hsiang, Ping Tung Hsien, Taiwan, Cina

IRCA Service S.p.A., ss Cremasca 591, n. 10, 24040 Fornovo San Giovanni (BG)

SIPCAM S.p.A., via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano sul Lambro (LO)

INDUSTRIAS AFRASA, S.A. Ciudad de Sevilla, 53, P.I. Fuente del Jarro, 46988 Paterna (Valencia) Spain

Albaugh TKI d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

**Distribuito da: De Sangosse Italia S.r.l.**

**Via Jappelli 4 – 35031 Abano Terme (PD)**

**Registrazione n. 16531 Ministero della Salute del 11/01/2016**

**Contenuto Netto:** ml 150 – 250 – 500; litri 1 – 5

Partita n. : vedi corpo della confezione

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici nelle applicazioni su tutte le colture adottare una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali. Per proteggere gli organismi terrestri target non bersaglio, non trattare in una fascia di rispetto di 5 m per colture di cereali, mais e pomodoro e 10 m per la vite da aree non coltivate.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli insetti impollinatori non applicare al momento della fioritura o in presenza di melata. Il prodotto non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (ad es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione comprendendo possibilmente anche le immediate vicinanze della coltura.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Deltametrina:** blocca la trasmissione nervosa iperstimolando prepostsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini

**Sintomi a carico del SNC:** tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico, allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione

**N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.**

**Consultare un Centro Antiveneni**

### CARATTERISTICHE

TEMPORIS STAR è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**Viticultura:** contro tignole e cicalina verde 60-80 ml/hl (0,67-0,83 L/ha), scafoideo 50-80 ml/hl (0,5-0,83 L/ha). Massimo 3 trattamenti per anno.

### Cereali:

- **mais** (contro piralide e sesamia) nella fase di allungamento del fusto (BBCH 31-39) 133 ml/hl (1,33 L/ha), alla comparsa del pennacchio (BBCH 51-59) 80 ml/hl (0,83 L/ha). Trattamenti: Massimo 3 per O. nubilalis, 2 per S. nonagrioides.

- **frumento** (trattamenti primaverili-estivi): contro afidi 50 ml/hl (0,5 L/ha). Trattamenti: Massimo 3.

- **frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo, 50 ml/hl (0,5 litri/ha), allo stadio di 1-3 foglie. Trattamenti: Massimo 3.

**Zucchini**) in campo e serra: contro nottue, mamestra, spodoptera, minatrice fogliare, afidi, dorifora, cimice verde, tripidi, aleurodidi: 80 ml/hl (0,83 L/ha). Trattamenti: massimo 3 per anno.

Su peperone in campo, intervallo minimo tra le applicazioni di 14 giorni. Su peperone in serra, intervallo minimo tra le applicazioni di 7 giorni.

\*Per **Melone, Cocomero e Zucca:** applicazioni solo in campo. Dose 80 ml/hl (0,83 L/ha – Trattamenti: massimo 3 per anno.

Diluire la dose indicata di TEMPORIS STAR in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro. TEMPORIS STAR agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato, badando a che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie.

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto si usa da solo.

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta su colza, 30 giorni su cereali, 15 giorni su uva da vino, 7 giorni su uva da tavola, 3 giorni su ortive (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchini, melone, cocomero, zucca).**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

® Marchio registrato di Albaugh LLC o una sua affiliata

**Pomodoro, Peperone, Melanzana, \*Cucurbitacee (Cetriolo,**